


Vårdförloppet svårläkta sår

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet svårläkta sår implementeras nu runt om i Sverige. Detta vårdförlopp går hand i hand med vårdförloppen venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår, kritiskt benischemi och diabetes med hög risk för fotsår. En del regionen har kommit långt i implementeringsarbetet och andra har precis startat upp.

RiksSår kan användas som stöd och hjälp i implementeringsarbetet, och är det enda sättet att följa de nio kvalitetsindikatorerna som beskrivs i vårdförloppet. RiksSår kan dessutom användas som inventering och baslinje i samband med Gap-analys.

Hur RiksSår kan användas i implementeringsarbetet:

1. Anslut till RiksSår och börja registrera er enhets patienter med svårläkta sår. Inventering av patienterna kan vara en del av Gap-analysen, till exempel avseende andel med dokumenterat kärlstatus, diagnosfördelning, smärta m.m.: [RiksSår - RiksSår](#)
2. Basbedömning tillförsäkras genom första registreringen i RiksSår. Mallar för första registreringen finns att skriva ut och ha på sin mottagning: [mall-förstabetesök-3-0-lik-registret-version-3.pdf](#).
3. Fickformat för Basbedömning finns att tillgå och skriva ut: [fickformat-basbedömning-diagnosspecifik-utredning-och-behandling-mars-2024.pdf](#)
4. Fickformat för Basbehandling finns att tillgå och skriva ut: [fickformat-lokal-sårbehandling-rikssår-feb-2024.pdf](#)
5. RiksSårs e-learning följer det nationella vårdförloppet och vårdprogrammet: [E-learning sårutbildning - RiksSår](#)
6. När man har registrerat sina patienter i RiksSår kan man ta ut rapporten *Vårdförloppet svårläkta sår* och följa de nio kvalitetsindikatorerna över tid.



7. RiksSår rapporterar direkt till Vården i siffror: [Vården i siffror](#)

För detaljerad information om hur indikatorerna beräknas, hänvisas till webbplatsen [Indikatorbeskrivningar - KIK](#) där kompletta specifikationer publiceras i takt med att de är genomarbetade. Där beskrivs och motiveras också de valda indikatorerna. Nedan ses de nio indikatorerna med eftersträvarsvärt målvärde.

Indikator	Målvärde (Preliminära!)	Önskad riktning
Etiologisk diagnos	> 90 %	Högt
Sårläkningstid (median)	< 120 dagar	Lågt
Antibiotika vid venösa bensår	< 25 %	Lågt
Smärtbehandling	>80 %	Högt
Kompressions-behandling venösa sår	100 %	Högt
Sekundärprevention av venösa sår	100 %	Högt
Sekundärprevention av trycksår	100 %	Högt
Recidiv av venösa sår	< 10 %	Lågt
Recidiv av trycksår	< 10 %	Lågt

Exempel på hur RiksSår har använts vid implementering i en region i Sverige, se PP Nationellt vårdförlopp svårläkta sår landar i Blekinge