

Vårdförloppets mål

Vårdförloppet har som mål att

- patientens sår läker utan onödig fördröjning
- förhindra att patienten får sårrecidiv och nya sår
- förbättra patientens livskvalitet
- minska förskrivning av antibiotika där kliniska tecken på infektion saknas.

Målen ska uppnås genom

- tidig basbedömning, diagnos och basbehandling
- behandling av sårorsaken
- att patienten är välinformerad och delaktig
- att patienten får adekvat smärtbehandling
- att det finns en tydligt dokumenterad och individualiserad plan för behandling och samordning med andra behandlande vårdenheter
- uppföljning efter läkt sår med väl fungerande egenvård.

<https://vardpersonal.1177.se/kunskapsstod/vardforlopp/svarlakta-sar/#section-1936>

Målvärden för
vårdförloppets
indikatorer

Målvärden på rikssar.se*

► *Arbete pågår att fastslå nationella målvärden. Målen kan därför komma att justeras framåt.

Indikator	Målvärde (Preliminära!)	Önskad riktning	Svarar mot vårdförloppets mål om
Etiologisk diagnos	> 90 %	Högt	• sårhäkning utan onödig fördröjning. • förbättrad livskvalitet
Sårhäkningstid (median)	< 120 dagar	Lågt	• sårhäkning utan onödig fördröjning. • förbättrad livskvalitet
Antibiotika vid venösa bensår	< 25 %	Lågt	• minskad förskrivning av antibiotika
Smärtbehandling	>80 %	Högt	• förbättrad livskvalitet
Kompressions- behandling venösa sår	100 %	Högt	• sårhäkning utan onödig fördröjning.
Sekundärprevention av venösa sår	100 %	Högt	• att förhindra sårrecidiv • förbättrad livskvalitet
Sekundärprevention av trycksår	100 %	Högt	• att förhindra sårrecidiv • förbättrad livskvalitet
Recidiv av venösa sår	< 10 %	Lågt	• Resultatmått för sekundärpreventiva åtgärder
Recidiv av trycksår	< 10 %	Lågt	• "

Att använda målvärden i utvecklingsarbete

Indikator	Målvärde	Mina resultat	Varför? Vad kan vi göra?
Etiologisk diagnos	> 90 %	80 %	
Sårläkningstid (median)	< 120 dagar		
Antibiotika vid venösa bensår	< 25 %	20 %	
Smärtbehandling	>80 %	80 %	
Kompressions-behandling venösa sår	100 %	90 %	
Sekundärprevention av venösa sår	100 %	90 %	
Sekundärprevention av trycksår	100 %	100 %	

